



SÜRGŐS KÓRHÁZI ELLÁTÁST ÉS VIZSGÁLATOT IGÉNYLŐ TÜNETEK GYERMEKKORBAN

- Ha **3 hónaposnál fiatalabb csecsemő** lázas, nem etethető, nem ébreszthető, bőrszíne megváltozik (az édesanya ösztöne azt súgja, hogy valami nincs rendben).
- Ha a gyermekük **lázás, tarkója kötött** (vagyis fejét nem tudja fájdalom nélkül előrehajlítani) és bőrkiütésre emlékeztető **bőrvérzések** jelennek meg a testén.
- Ha gyermek tudatállapota hirtelen megváltozik, **elveszti eszméletét**.
- Ha **görcsöt** észlelnek (vagyis amikor a gyermek teste 2 percnél hosszabb ideig megfeszül vagy végtagjai ritmikusan ránganak, tekintete elréved).
- Ha a görcsöt láz kíséri, a gyermeknek nem volt korábban lázgörcse.
- Ha **erős fejfájás, hányások** és **tudatállapot változást, zavartságot** tapasztalnak **fejért ütést követően** és a korábban biztonságosan jól járó gyermek járása bizonytalanná, dülöngélővé válik.
- Ha erős vagy **erősödő fájdalom jelentkezik a test bármely részén**, különösen ha ez hasi fájdalom.
- Ha **ismételt hányások és hasmenés együtt** van jelen és a gyermek itatása nem megoldható, a kiszáradás jeleit észlelik (mint: besüppedt nagykutacs, aláárkolt szemek, száraz nyelv, elesettség, gyengeség és 8 órán belül nem ürült vizelet).
- Ha **hirtelen kezdetű köhögés, fuldoklás, nyelési képtelenség** áll fenn és felmerül annak lehetősége, hogy a gyermek félrenyelt valamilyen apróbb tárgyat, cukorkát, magot, ételdarabot.
- Ha a gyermek légvétele nyugalomban is szapora és légszomja van. **Légzése ziháló, levegőért kapkodó**, az ajkak és a bőr lilásan elszíneződik.
- Ha **köhögési hangja fókaugatásra** emlékeztető és nyugalomban is jelen van a jellegzetes légzési hang.
- Nem csak síráskor jelentkező, hanem nyugalomban is jelenlévő **légszomj, szapora légvételek**.
- Ha felmerül **mérgezés** gyanúja (otthon tárolt gyógyszerek, vegyszerek, takarító- és mosószerek kerülnek a gyermek szájába vagy lenyeli azokat).
- Mély, nagyobb kiterjedésű **égési, fagyási sérülések** esetén.
- Kutya vagy egyéb **állat harapás**akor. Földdel szennyezett sebek keletkezése miatt.
- Ha olyan erejű **sérülés**, biciklivel történő esés, **baleset** következik be, ami csontsérüléssel vagy a belső szervek sérülésével is járhat.
- **Nagyobb mennyiségű vérvesztés** esetén.
- Ha a gyermek ismert **alapbetegségében hirtelen rosszabbodás** áll be (pl.: cukorbetegség, asztma).
- Ha **allergiás reakciót** vált ki valamilyen étel, darázscsípés vagy egyéb rovar csípése (ami kapcsán émelygés, hányinger, szédülés, szemhéj, arc- és ajakduzzanat, terjedő bőrpír és légszomj lépnek fel).
- És minden olyan esetben, amikor úgy érezné, hogy a gyermeknek sürgős orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra van szüksége!